



## Betegtájékoztató műtéli fogeltávolítás után



**Műtét utáni teendők** - a műtétet követően fájdalomcsillapító alkalmazása szükséges (pl. Cataflam, Advil Ultra Forte). Bizonyos esetekben antibiotikum szedése is javasolt (pl. Dalacin). Egyes betegségek (pl. szívbetegség) esetén az antibiotikum szedését már a műtét előtt el kell kezdeni! Amíg hat a fájdalomcsillapító, enni semmit sem szabad. A műtét után egy hétig tejtermékek (tej, sajt, kefir, joghurt) fogyasztása ellenjavallt. A varratokat egy héttel a műtét után eltávolítjuk. Előfordulhat, hogy a seb ekkor is okoz még panaszokat.

**Fogmosás** - a seb közvetlen környezetét és a varratokat puha fogkefével vagy ujjbegyre tett fogkrémmel, a műtét utáni naptól szükséges tisztítani. Fogat mosni már a műtét napján is kell! Javasolt fertőtlenítő hatású szájöblítő (pl. Chlorhexamed, Corsodyl) használata napi 2 alkalommal. Előfordulhat, hogy a gyógyulás során egy-egy varrat magától is kiesik, ez nem jelent problémát. A fog helyének teljes csontosodása több hetet vesz igénybe a varratok eltávolítását követően. A fognak megfelelő helyen esetenként mélyedés látható, ahol könnyebben megtapadhat az ételmaradék, ezért fokozott figyelmet igényel a tisztán tartása.

**Jegelés** - a hideg borogatás segít a duzzanat, fájdalom mérséklésében. Jegelésre legalkalmasabb a száraz ruhába csavart jégzsél vagy jégakku. A jegelés kíméletes legyen, időnként szükséges a jég eltávolítása, a bőr pihentetése. A jegelésnek a beavatkozást követő első 1-2 napban van jelentősége.

**Lehetséges szövődmények** - ha ezeket tapasztalja, sürgősen jelentkezzen orvosánál!

- **Sebfertőzés.** Amennyiben a műtét után láz jelentkezik, a seb egyre fájdalmasabbá válik, a duzzanat fokozódik, esetleg a sebből genny ürül, sebtisztításra és antibiotikus kezelésre lehet szükség.
- **Állcsonttörés.** Amennyiben a rágás mindkét oldalon fájdalmas, a fogak záródása eltér a megszokottól, friss OP felvétel és orvosi kontrol javasolt.
- **Idegsérülés** (alsó fogak esetén). Amennyiben a műtétet követő napokban az érzéstelenítő hatása nem múlik el teljesen, a műtét oldalán az alsó ajakban zsibbadás marad, felmerül az idegsérülés lehetősége. Ilyenkor B-vitamin szedése javasolt.
- **Arcüreg megnyílása** (felső fogak esetén). Ha véres orrváladékozás, orrdugulás, arcfájdalom követi a műtétet, előfordulhat, hogy megnyílt az arcüreg. Ebben az esetben antibiotikum és orrcsepp használata javasolt.

**Jobbulást kívánunk!**